

WORKSHOP „MÍSTO BOTULINUMTOXINU V TERAPII DYSFUNKCÍ DOLNÍCH CEST MOČOVÝCH“

Jan Krhut^{1,2}

¹Urologické oddělení, FN Ostrava

²Katedra chirurgických oborů LF OU Ostrava

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologické oddělení,

Fakultní nemocnice Ostrava

Tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava–Poruba

e-mail: jan.krhut@fno.cz

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře:

Článek vznikl bez podpory, jedná se o nezávislý článek.

Ilustrační foto:

Autor

.....

Sekce urodynamiky, neuroulogie a urogynekologie při České urologické společnosti ČLS JEP uspořádala dne 16. září 2015 v Praze workshop na téma „Místo botulinumtoxinu v terapii dysfunkcí dolních cest močových“.

Organizátoři workshopu tím reagovali zejména na fakt, že botulinumtoxin byl v nedávné době oficiálně registrován i pro léčbu neurogenní a idiopatické hyperaktivity detruzoru.

Cílem workshopu bylo především shrnout dosavadní zkušenosti s touto léčbou v ČR a konfrontovat je se současnými poznatky „evidence based medicine“ a doporučeními mezinárodních odborných společností (Evropská urologická asociace, Mezinárodní společnost pro kontinenci).

Odborný program byl sestaven z přednášek urologů z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha,



Doc. MUDr. Zachoval, Ph.D., při přednášce na workshopu

Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice Praha, Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc, Urologického oddělení Nemocnice České Budějovice, Urologického oddělení Krajské nemocnice Liberec a Urologického oddělení FN Ostrava. Podrobně byla prezentována problematika techniky aplikace, délky trvání efektu, řešení evakuačních dysfunkcí po léčbě botulinumtoxinem apod. Jedna přednáška byla věnována rovněž praktickému postupu při preskripci botulinumtoxinu a otázce vykazování a úhrad této léčby. Velká pozornost byla věnována rovněž indikačním kritériím pro léčbu botulinumtoxinem a výběru vhodných pacientů. Program byl doplněn rovněž rozbohem klinických kazuistik, do jejichž řešení se aktivně zapojilo celé auditorium. Velký prostor byl tradičně věnován diskuzi, která pokračovala neformálně i po ukončení celého workshopu.

Celý workshop se tradičně konal v přátelské a neformální atmosféře. Vzhledem k velmi pozi-

tivním ohlasům od účastníků workshopu bezprostředně po jeho ukončení budou organizátoři nejspíše zvažovat opakování této akce. Stále totiž zůstává řada nejasností, které by si zasloužily v budoucnu pozornost – ať už se jedná o legislativní otázky spojené s touto léčbou nebo o problematiku závislosti délky trvání účinku na dávce. Otázkou ke zvážení je rovněž případné vytvoření celostátního registru pacientů léčených botulinumtoxinem v urologických indikacích, který by umožnil smysluplné hodnocení dlouhodobé efektivity a bezpečnosti této léčby v našich podmínkách a poskytnul data pro budoucí jednání s plátcí zdravotní péče.

Děk za úspěch setkání patří především všem přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž České urologické společnosti ČLS JEP a dalším partnerům, kteří konání této akce podpořili.

Za organizátory J. Krhut
2. 10. 2015

Prostamol[®] UNO[®]

Serenoový extrakt

PRO MUŽE S MÍRNÝMI AŽ STŘEDNĚ TĚŽKÝMI PŘÍZNAKY BHP¹

Studie prokázaly, že lék Prostamol UNO

- zlepšuje příznaky u BHP¹
- měřitelně zlepšuje Q_{max} a RUV^{2,3,4}
- má dobrý profil snášenlivosti^{2,3,4}
- nenarušuje sexuální funkce⁵



Nečekejte, jedněte včas

Zkrácená informace o přípravku Prostamol UNO Složení: Serenoae extractum (9-11:1) 320 mg v 1 měkké tobolce. **Indikace:** Mírní obtíže při benigní hyperplazii prostaty I. a II. stupně. **Farmakodynamické vlastnosti:** Extrakt z plodů Serenoy blokuje vazbu dihydrotestosteronu na receptor a inhibuje působení 5- α -reduktázy. Další faktory, které mohou mít vliv na inhibici zbytnění prostaty, jsou: inhibice vazby prolaktinu na receptory a narušení procesu přenosu signálu, protizánětlivé působení následkem inhibice 5-lipoxygenázy, inhibice proliferace epitelu prostaty, antiedematózní účinek. **Dávkování:** 1x denně 1 měkkou tobolku po jídle, vždy ve stejnou denní dobu. Měkké tobolky se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Délka léčby závisí na povaze, závažnosti a průběhu onemocnění a není časově omezena. Pro úspěšnost léčby je důležité zejména pravidelné užívání přípravku každý den. Zlepšení obtíží lze očekávat až po cca 30 dnech. Může trvat až 3 měsíce, než je dosaženo plné účinnosti přípravku. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na složky přípravku. **Upozornění:** Prostamol UNO zlepšuje obtíže při hyperplazii prostaty a zřejmě zabraňuje dalšímu zbytnění tkáně prostaty. Proto by měl pacient navštěvovat pravidelně lékaře. Zvláštní opatření je zapotřebí: – pokud se objeví krv v moči nebo spermatu, – pokud pacient trpí neustálým odkapáváním moči (inkontinence z přeplnění močového měchýře), – pokud pacient pociťuje bolestivé nutkání močit doprovázené náhlou neschopností vymočít se (akutní retence moči), – pokud pacient pociťuje bolesti kostí nebo k výše uvedeným příznakům I. nebo II. stádia benigní hyperplazie prostaty ještě trpí nechtěným, hubne nebo má horečku. Uvedené příznaky mohou doprovázet nádorové onemocnění prostaty nebo močového měchýře. Před zahájením léčby přípravkem Prostamol UNO je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost následujícím stavům: – pokud pacient trpí výše uvedenými obtížemi s močením a zároveň má infekci močových cest, urolitiázu nebo je-li silný kuřák. U kuřáků existuje vyšší riziko nádorového onemocnění močových cest. – pokud se nádor nebo tzv. familiární nádor prostaty objevil u blízkých příbuzných pacienta. **Nežádoucí účinky:** Vzácné: žaludeční obtíže. **Balení:** 30, 60 nebo 90 měkkých tobolek. **Držitel registrace:** Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Berlín, Německo. **Reg. číslo:** 94/437/00-C **Datum poslední revize:** 29. 7. 2015. Přípravek je vydáván i bez lékařského předpisu a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. **Před předepsáním si přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku.** **URČENO POUZE ODBORNÍKŮM VE SMYSLU ZÁKONA 40/1995 SB.**

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s.r.o.
Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4
tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336
e-mail: office@berlin-chemie.cz