

# OBJEMNÝ HEMATOM V POCHVĚ PŘÍMÉHO BŘIŠNÍHO SVALU PROPAGUJÍCÍ SE DO RETZIOVA PROSTORU PŘI CHRONICKÉ ANTIKOAGULAČNÍ TERAPII S ROZVOJEM RENÁLNÍ INSUFICIENCE NA PODKLADĚ ÚTLAKU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S JEHO NÁSLEDNOU SPONTÁNNÍ PERFORACÍ

A large rectus sheath haematoma spreading to Retzius' space (chronic antithrombotic therapy) followed by acute kidney injury caused by urinary bladder compression with its spontaneous perforation

Jan Novák<sup>1</sup>, Lubomír Hyršíl<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a. s.

Došlo: 23. 12. 2017

Přijato: 20. 2. 2018

**Kontaktní adresa:**

MUDr. Jan Novák

Urologické oddělení

Oblastní nemocnice Kladno, a. s.

Vančurova 1548, 272 59 Kladno

email: honza.novak11@gmail.com

**Střet zájmů:** žádný

**Prohlášení o podpoře:**

Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.

**SOUHRN**

Novák J, Hyršíl L. Objemný hematom v pochvě přímého břišního svalu propagující se do Retziova prostoru při chronické antikoagulační terapii s rozvojem renální insuficience na podkladě útlaku močového měchýře s jeho následnou spontánní perforací.

V následující kazuistice prezentujeme osmdesátiletou polymorbidní pacientku, u níž při chronické antikoagulační terapii došlo k rozvoji krvácení do pochvy přímého břišního svalu s tvorbou objemného hematomu v Retziově prostoru, čímž došlo k oligoanurii a akutní renální insuficienci na podkladě útlaku močového měchýře s jeho následnou spontánní perforací.