

mezi 29 a 93 lety (průměr 59,6 roku, medián 60). Přibližně 50 % účastníků studie bylo ve věku  $\geq 60$  let. Doba trvání symptomů OAB se pohybovala v rozmezí od 1 do 141 měsíců (medián 18 měsíců) a od doby od diagnózy od 1 do 140 měsíců (medián 17 měsíců). Všichni pacienti byli léčeni jiným antimuskarinikem než solifenacinem během čtyř týdnů do zahájení studie. 741 pacientů (37,1 %) přešlo z tropsia, 369 (18,5 %) z fesoterodinu, 247 (12,4 %) z tolterodinu, 246 (12,3 %) z oxybutyninu, 25 (1,3 %) z darifenacinu. Zbývajících 126 pacientů (6,3 %)

přešlo z „jiných“ antimuskarinových léčiv (tabulka 1). Použití inkontinenčních pomůcek bylo zaznamenáno u 197 pacientů (9,9 %).

Ze 703 mužů byla u 477 (67,9 %) diagnostikována také benigní hypertrofie prostaty (BPH). U mužů s BPH bylo 279 (58,5 %) léčeno farmakoterapií tamsulosin (67,4 %), fytoterapie (32,6 %), finasterid (18,6 %), alfuzosin (17,6 %), doxazosin (15,8 %), terazosin (1,1 %) a jiné (5,7 %).

Při první návštěvě bylo 1 598 pacientům (79,9 %) předepsáno 5 mg solifenacinu denně a 40

**Tab. 1.** OAB diagnóza a předchozí léčba

**Tab. 1.** The diagnosis of OAB and previous treatment

Parametr	Category	PPS		mITT		FAS	
	Statistika	(n = 1 481)		(n = 1 892)		(n = 2 000)	
Trvání symptomů OAB (měsíce)	n	1 481	(100 %)	1 892		2 000	
	průměr	25,2		25,1		25,0	
	SD	24,7		24,4		24,4	
	Min	1		1		1	
	Medián	18		18		18	
	Max	123		141		141	
Trvání příznaků OAB	Do 1 roku	630	(42,5 %)	793	(41,9 %)	847	(42,4 %)
	1–2 roky	206	(13,9 %)	276	(14,6 %)	284	(14,2 %)
	2–3 roky	189	(12,8 %)	253	(13,4 %)	267	(13,4 %)
	> 3 roky	456	(30,8 %)	570	(30,1 %)	602	(30,1 %)
Způsob diagnózy	Symptomaticky	1 116	(75,4 %)	1 412	(74,6 %)	1 495	(74,8 %)
	Urodynamicky	76	(5,1 %)	99	(5,2 %)	101	(5,1 %)
	Sympt. a urodyn.	289	(19,5 %)	381	(20,1 %)	404	(20,2 %)
Trvání symptomů OAB (měsíce)	n	1 481		1 892		2 000	
	průměr	24,4		24,2		24,2	
	SD	24,6		24,3		24,3	
	Min	1		1		1	
	Medián	17		17		17	
	Max	122		140		140	
Trvání příznaků OAB	Do 1 roku	656	(44,3 %)	827	(43,7 %)	881	(44,1 %)
	1–2 roky	199	(13,4 %)	265	(14 %)	274	(13,7 %)
	2–3 roky	188	(12,7 %)	252	(13,3 %)	265	(13,3 %)
	> 3 roky	438	(29,6 %)	548	(29 %)	580	(29 %)
Předchozí léčba OAB	Trospium	550	(37,1 %)	706	(37,3 %)	741	(37,1 %)
	Fesoterodine	280	(18,9 %)	353	(18,7 %)	369	(18,5 %)
	Propiverine	187	(12,6 %)	232	(12,3 %)	246	(12,3 %)
	Tolterodine	174	(11,7 %)	231	(12,2 %)	247	(12,4 %)
	Darifenacin	17	(1,1 %)	24	(1,3 %)	25	(1,3 %)
	Oxybutynin	175	(11,8 %)	220	(11,6 %)	246	(12,3 %)
	Jiné	98	(6,6 %)	126	(6,7 %)	126	(6,3 %)