

# MONDOROVA CHOROBA PENISU – NAŠE ZKUŠENOSTI

Mondor's penile disease – our results

Jiří Ladman<sup>1,2</sup>, Marek Koch<sup>2</sup>, Radka Bulínová<sup>2</sup>, Miloš Miniberger<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Urologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice

<sup>2</sup>Urologické oddělení, Nemocnice Písek, a. s., Písek

<sup>3</sup>Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Písek, a. s., Písek

Došlo: 5. 3. 2018

Přijato: 10. 5. 2018

## Kontaktní adresa:

MUDr. Jiří Ladman

Urologické oddělení,

Nemocnice České Budějovice, a.s.

B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

e-mail: j.ladman@seznam.cz

**Střet zájmů:** žádný

## Prohlášení o podpoře:

Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.

## SOUHRN

Ladman J, Koch M, Bulínová R, Miniberger M. Mondorova choroba penisu – naše zkušenosti.

Mondorova choroba je vzácný druh tromboflebitidy postihující povrchové žíly a vyznačující se zejména fibroprodukcí. Projevuje se jako tuhý, většinou bolestivý pruh v průběhu žíly. Častěji se vyskytující u žen, kde je lokalizovaný především na trupu, u mužů je vzácnější a vyskytuje se navíc i na penisu. Etiologie onemocnění se opírá především o Virchowovu trias (porušení endotelu cévní stěny, stáza krve a hyperkoagulační stav).

**Cíl:** Cílem příspěvku je podat ucelený souhrn našich zkušeností s diagnostikou a léčbou v souboru pacientů z našeho oddělení za poslední tři roky.

**Soubor pacientů a metody:** Naše skupina obsahuje sedm mladých mužů. K určení diagnózy nás dovedla anamnéza, fyzikální vyšetření a ultrasonografie s užitím barevného dopplerovského vyšetření. Všem mužům bylo doporučeno vyšetření na hematologii za účelem vyloučení koagulopatie.

**Výsledky:** Onemocnění mělo benigní průběh a jeho léčba byla především konzervativní a ambulantní. Ve dvou případech došlo k recidivě tromboflebitidy.

**Závěr:** Délka terapie se u našich pacientů odvíjela na podkladě klinického nálezu za opakovaných kontrol, obsahovala jak podávání antibiotické profylaxe, tak antikoagulancií. Hematologické vyšetření absolvovali jen čtyři pacienti a u tří byla zjištěna zvýšená aktivita faktoru VIII. Léčbu a dovyšetření pacientů komplikovala špatná compliance.

## KLÍČOVÁ SLOVA

Mondorova choroba, tromboflebitida, v. dorzalis penis superficialis, zvýšená aktivita faktoru VIII.

## SUMMARY

Ladman J, Koch M, Bulínová R, Miniberger M. Mondor's penile disease – our results.