






Obr. 1. Graf závislosti ušetřených biopsií a nediodagnostikovaných signifikantních KP na PSA denzitě ve skupině pacientů bez předchozí biopsie s negativní MRI (PIRADS < 3)

Fig. 1. Lesions with a PIRADS score < 3 in the first biopsy group. The percentage of biopsies that would be avoided and the percentage of clinically significant cancers that would be missed as a function of PSA density




Obr. 2. Graf závislosti ušetřených biopsií a nediodagnostikovaných signifikantních KP na PSA denzitě ve skupině rebiopsií u pacientů s negativní MRI (PIRADS < 3)

Fig. 2. Lesions with a PIRADS score < 3 in the repeat biopsy group. The percentage of biopsies that would be avoided and the percentage of clinically significant cancers that would be missed as a function of PSA density



Obr. 3. Graf závislosti ušetřených biopsií a nediodagnostikovaných signifikantních KP na PSA denzitě ve skupině pacientů bez předchozí biopsie s nálezem PIRADS 3

Fig. 3. Lesions with a PIRADS score of 3 in the first biopsy group. The percentage of biopsies that would be avoided and the percentage of clinically significant cancers that would be missed as a function of PSA density



Obr. 4. Graf závislosti ušetřených biopsií a nediodagnostikovaných signifikantních KP na PSA denzitě ve skupině rebiopsií u pacientů s nálezem PIRADS 3

Fig. 4. Lesions with a PIRADS score of 3 in the repeat biopsy group. The percentage of biopsies that would be avoided and the percentage of clinically significant cancers that would be missed as a function of PSA density