

Endometrióza močového měchýře jako příčina iatrogenní perforace močového měchýře

Endometriosis of the bladder as a cause of iatrogenic bladder perforation

Jan Pávek

Urologické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Orlickoústecká nemocnice,
Ústí nad Orlicí

Došlo: 13. 1. 2019

Přijato: 25. 2. 2019

Kontaktní adresa:

MUDr. Jan Pávek
Urologické oddělení, Nemocnice
Pardubického kraje, a. s.
Orlickoústecká nemocnice
Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
e-mail: jan.pavek@nempk.cz

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře:

Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.

SOUHRN

Pávek J. Endometrióza močového měchýře jako příčina iatrogenní perforace močového měchýře.

Prezentuji kazuistiku 28leté ženy s klinickým podezřením na endometriózu močového měchýře, u které v rámci komplikovaného diagnostického postupu došlo k iatrogenní perforaci močového měchýře.

KLÍČOVÁ SLOVA

Endometrióza, močový měchýř, iatrogenní perforace.

SUMMARY

Pávek J. Endometriosis of the bladder as a cause of iatrogenic bladder perforation.

I report a case of a 28-year-old woman with a clinical suspicion of bladder endometriosis, in which iatrogenic bladder perforation occurred within the complicated diagnostic procedure.

KEY WORDS

Endometriosis, bladder, iatrogenic perforation.

.....

ÚVOD

Endometrióza je onemocnění charakterizované ektopickým výskytem děložní sliznice. Prevalence v populaci se odhaduje okolo 10 % žen v reprodukčním věku (1). Postižení uropoetického traktu je vzácné, četnost se pohybuje kolem 1–2 % (1, 2, 3). Nejčastěji bývá postižen močový měchýř, a to zhruba v 90 % případů (1). Endometrióza močového měchýře nejčastěji vzniká prorůstáním zvenčí, z endometroidního uzlu na děloze (adenomyóza) (3, 5, 7).

Diagnostika endometriózy močového měchýře je založena na anamnéze, laboratorních a zob-