

Sebepoškozování urogenitálního traktu – je řešení pouze na urologovi?

Self-mutilation of the urogenital tract – is the solution limited to urologists?

Babajide Adedokun

Urologická klinika FN a LF MU v Brně

Došlo: 13. 12. 2018

Přijato: 15. 2. 2019

Kontaktní adresa:

MUDr. Babajide Adedokun
Urologická klinika FN a LF MU Brno
Jihlavská 20, 639 00 Brno
e-mail: adedokun.babajide@fnbrno.cz

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře:

Nezávislý článek.

SOUHRN

Adedokun B. Sebepoškozování urogenitálního traktu – je řešení pouze na urologovi?

Případ šedesátiletého pacienta s poruchou sexuální preference s tendencí k sebepoškozování zaváděním absurdních cizích těles do urogenitálního traktu. Jeho praktiky vedly k poškození uretry a zevního genitálu do takové míry, že byla nutná operační revize a extrakce cizího tělesa z levostranného kavernózního tělesa.

KLÍČOVÁ SLOVA

Sebepoškozování, urogenitální trakt, cizí těleso, cizí předměty, antiandrogen.

SUMMARY

Adedokun B. Self-mutilation of the urogenital tract – is the solution limited to urologists?

The case of a sixty-year-old man with a disorder of sexual preference and with a tendency to mutilate himself by inserting absurd foreign objects into the urogenital tract. His practices led to damage of his urethra and external genitalia to such an extent that it was necessary to extract one foreign body from the left corpus cavernosum under general anesthesia.

KEY WORDS

Self-mutilation, urogenital tract, foreign bodies, foreign objects, antiandrogen.

.....

ÚVOD

Sebepoškozování urogenitálního traktu je problém, se kterým se budou urologové setkávat více. U mužů je psychóza příčinou 80 % případů, zatímco většina případů sebepoškozování urogenitálního traktu u žen je spojena s poruchami osobnosti (1). Výskyt v literatuře je vzácný a jejich popis nedosta-
tečný. Sebepoškozování urogenitálního traktu je