

Diagnostika a laparoskopická sutura extraperitoneální ruptury močového měchýře

Diagnosis and laparoscopic suture of an extraperitoneal rupture of the urinary bladder

Milan Hora

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

Došlo: 27. 1. 2019

Přijato: 6. 2. 2019

Kontaktní adresa:

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
e-mail: horam@fnplzen.cz


Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře:

Zpracování článku nebylo podpořeno žádnou společností.

.....

Žena, 84 let, po pádu doma vyšetřena pro úraz pravého ramene a pravého boku skiagrafií. Následně indikováno CT břicha a pánve s podáním jodové kontrastní látky. Diagnostikována fraktura horního raménka kosti stydké vpravo (Obr. 1), močový měchýř byl při menší náplni bez známek perforace (Obr. 2). Při větší náplni močového měchýře však prokázán únik kontrastní látky z extraperitoneální ruptury močového měchýře. Provedena v poloze na zádech flexibilní cystoskopie a následně extraperitoneální laparoskopická revize močového měchýře ze



Obr. 1. Nativní CT koronární řez, šipka ukazuje frakturu horního raménka stydké kosti vpravo

Fig. 1. Non contrast CT coronal section, the arrow shows the fracture of the right superior pubic ramus