

Hormonálně senzitivní karcinom prostaty

Hormone sensitive prostate cancer

Nikol Rušarová^{1,2}, Marie Bartoušková¹, Hana Študentová¹

¹Onkologická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci

²Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Došlo: 24. 2. 2019

Přijato: 19. 5. 2019

Kontaktní adresa:

MUDr. Nikol Rušarová

Onkologická klinika,

Fakultní nemocnice v Olomouci

I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

e-mail: nikol.rusarova@fnol.cz

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Tato práce vznikla za podpory grantového projektu Univerzity Palackého v Olomouci č. IGA_LF_2018_010.

SOUHRN

Rušarová N, Bartoušková M, Študentová H. Hormonálně senzitivní karcinom prostaty.

Karcinom prostaty patří celosvětově mezi druhé nejčastější onemocnění postihující muže a jeho incidence stoupá s věkem. Přestože je u většiny pacientů onemocnění diagnostikováno a léčeno v časných stádiích, přibližně 10 % pacientů stále přichází již v metastatickém stadiu nemoci a část pacientů po lokoregionální terapii dospěje k relapsu. Současný výzkum vedl k rozvoji více léčebných modalit pro muže s pokročilým hormonálně senzitivním onemocněním, zahrnující kombinaci docetaxelu nebo abirateronu s androgen deprivací terapií.

KLÍČOVÁ SLOVA

Karcinom prostaty, androgen-deprivační terapie, docetaxel, abirateron.

SUMMARY

Rušarová N, Bartoušková M, Študentová H. Hormone sensitive prostate cancer.

Prostate cancer is the second most common cancer in men worldwide and its incidence rises with age. Although most cases of prostate cancer are diagnosed and treated in early stage of disease, almost 10 % of patients have evidence of metastatic prostate cancer at presentation, and others develop disseminated disease after their definitive treatment. Contemporary research has led to the development of multiple active treatment modalities for men with advanced disease including combination of docetaxel or abiraterone with androgen deprivation therapy.

KEY WORDS

Prostate cancer, androgen deprivation therapy, docetaxel, abiraterone.

.....

ÚVOD

Karcinom prostaty patří mezi druhé nejčastější nádorové onemocnění postihující muže. V roce