



Obr. 2. Umístění sítěky
Fig. 2. Mesh placement

Tab. 1. Demografická data pacientů

Tab. 1. Demographic data of patients

Věk	67 (61–73) let
PSA	10,29 (4,6–16,35) ng/ml
PHI	51,9 (31,65–71,47)
Čas operace	155 (107–190) min.
Krevní ztráta	470 (100–900) ml
Hmotnost prostaty	60 (32–136) g
Strana kýly	vpravo 9, vlevo 1
Pánevní lymfadenektomie	2 (20 %)
Šetření nervově cévních svazků	2 (20 %)
Doba katetrizace	13,78 (13–14) dní
Doba hospitalizace	7,8 (5–13) dní

U dvou pacientů (20 %) byla provedena laparoskopická radikální prostatektomie nervy šetřící, všechny ostatní operace (80 %) byly nervy nešetřící. Pánevní lymfadenektomie byla provedena ve dvou případech. Žádný pacient nevyžadoval podání transfuze. Patologicko-anatomická pooperační data pacientů shrnuje tabulka 2.

Originální síťka ProGrip™ Covidien™ byla použita u sedmi operací. Cena této sítěky je 3 090 Kč a lze ji vykázat ve zdravotním účtování (kód VZP 010537).

U prvních tří operací jsme si sítěky sami vyráběli, používali jsme nevstřebatelnou polypropylenovou síťku (Prolene® Ethicon®) velikosti 12× 8 cm, kterou jsme vertikálně nastříhli v délce 5–6 cm. Na konci

Tab. 2. Patologicko-anatomická pooperační data

Tab. 2. Pathological-anatomical postoperative data

Staging	Počet
pT2c	6
pT3a	3
pT3b	1
Positivní okraje	7
Gleason skóre 3 + 3	4
Gleason skóre 3 + 4	4
Gleason skóre 4 + 3	2

tohoto řezu jsme vytvořili menší otvor průměru asi 1 cm pro průchod semenného provazce a přišli překlápecí záplatu velikosti 6× 4 cm, která síťku fixovala kolem semenného provazce (9). Použití originální sítěky ProGrip™ Covidien™ je dle našich zkušeností lepší a jednodušší, díky polylaktátovým úchytům lépe přilne k okolní tkáni, a tím eliminuje tvorbu mrtvého prostoru s rizikem tvorby seromu.

U souboru našich pacientů jsme zaznamenali pouze jedinou komplikaci – u jednoho pacienta došlo v důsledku poškození cév semenného provazce při laparoskopické preparaci kýlního vaku k následné ischemii varlete. Nález byl řešen pátý pooperační den tříselnou orchiektomií, explantací sítěky a otevřenou hernioplastikou třísla (komplikace Clavien IIIb).

U našich pacientů jsme nezaznamenali žádnou jinou pooperační komplikaci, neměli jsme