

**Tab. 3.** Histopatologická charakteristika IKP**Tab. 3.** Histopathological characteristics of IKP

	<b>IKP</b>	<b>Singnif. KP</b>	<b>Nesignif. KP</b>	<b>p-value</b>
	<b>n</b>	<b>n (%)</b>	<b>n (%)</b>	
<b>pT</b>				
pT2a	13	5 (38,46 %)	8 (61,54 %)	
pT2b	5	4 (80,00 %)	1 (20,00 %)	
pT2c	3	2 (66,67 %)	1 (33,33 %)	
pT2 (a-c)	21	11 (52,38 %)	10 (47,62 %)	0,545 <sup>a)</sup>
pT3a	1	1 (100,00 %)	0 (0,00 %)	
<b>pT</b>				
pT2(a-c)	21	11 (52,38 %)	10 (47,62 %)	1,000
<b>Gleason skóre</b>				
≤ 6	16	6 (37,50 %)	10 (62,50 %)	0,012 <sup>b)</sup>
7 (3+4)	6	6 (100,00 %)	0 (0,00 %)	
7 (4+3)	0	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	
8–10	0	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	
<b>Gleason skóre</b>				
≤ 6	16	6 (37,50 %)	10 (62,50 %)	0,454
<b>Perineurální šíření</b>	6	5 (83,33 %)	1 (16,67 %)	0,119
<b>Lymfangioinvasze</b>	1	1 (100,00 %)	0 (0,00 %)	
<b>SVI</b>	0	0 (0 %)	0 (0 %)	
<b>EPE</b>	1	1 (100,00 %)	0 (0,00 %)	
<b>Výskyt</b>				
monofokální	11	5 (45,45 %)	6 (54,55 %)	0,335 <sup>c)</sup>
multifokální	11	7 (63,64 %)	4 (36,36 %)	
<b>Lokalizace tumoru</b>				
PZ	22	12 (54,55 %)	10 (45,45 %)	
TZ	1	1 (100,00 %)	0 (0,00 %)	
CZ	0	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	
<b>Chirurgické okraje</b>				
negativní	20	10 (50 %)	10 (50 %)	0,286 <sup>d)</sup>
pozitivní	2	2 (100 %)	0 (0,00 %)	
<b>Objem nádoru</b>				
n	22	12	10	
Průměr (Sm. odch.)	1,90 (3,50)	3,40 (4,25)	0,10 (0,11)	0,021
< 0,5 cm <sup>3</sup> (n)	13	3	10	0,000 <sup>e)</sup>
≥ 0,5 cm <sup>3</sup> (n)	9	9	0	
<b>&lt; 0,5 cm<sup>3</sup></b>				
Průměr (Sm. odch.)	0,12 (0,14)	0,20 (0,22)	0,10 (0,11)	0,290
<b>≥ 0,5 cm<sup>3</sup></b>				
Průměr (Sm. odch.)	4,47 (4,43)	4,47 (4,43)	0,00 (0,00)	
<b>iPSA*</b>				
n	20	10 (50,00 %)	10 (50,00 %)	
Průměr (Sm. odch.)	2,54 (1,43)	3,14 (1,55)	1,94 (1,04)	0,058