

Konverze kontinentní derivace na konduit retubularizací stěny neoveziky

Conversion of the continent diversion to a conduit by retubularization of a neobladder wall

Markéta Hulová, Michal Staník, Daniel Macík, Jan Doležel

Oddělení urologické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

Došlo: 9. 4. 2020

Přijato: 11. 5. 2020

Kontaktní adresa:

MUDr. Markéta Hulová
Oddělení urologické onkologie,
Masarykův onkologický ústav,
Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno
e-mail: marketa.hulova@mou.cz

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Autoři prohlašují, že práce nevznikla s finanční podporou.

SOUHRN

Hulová M, Staník M, Macík D, Doležel J. Konverze kontinentní derivace na konduit retubularizací stěny neoveziky.

V případě nutnosti konverze močové derivace na ileální konduit lze s výhodou využít materiál ilea z původní derivace a jeho retubularizací získat požadovanou délku konduitu. Je možné se tak vyhnout další resekci střeva a není nutná nová střevní anastomóza ani reimplantace močovodů.

KLÍČOVÁ SLOVA

Derivace moče, kontinentní neovezika, ileální konduit, augmentace.

SUMMARY

Hulová M, Staník M, Macík D, Doležel J. Conversion of a continent diversion to a conduit by retubularization of a neobladder wall.

If it is necessary to convert a urinary diversion to an ileal conduit, it is advantageous to use the material of the ileum from the original diversion and retubularize it to obtain the desired length of the conduit. Further resection of the intestine can be avoided and no new intestinal anastomosis or ureter reimplantation is required.

KEY WORDS

Urinary diversion, continent neobladder, ileal conduit, augmentation.

.....

ÚVOD

Cystektomie s ortotopickou močovou derivací je běžně prováděná u pacientů s nádory močového měchýře, méně často u intersticiální cystitidy, při nálezu kontrahovaného měchýře po radioterapii pánve nebo u neurogenního měchýře (1, 2). V některých situacích, zejména po cystektomii z onkologické indikace, vyvstane nutnost konverze ortotopického rezervoáru na jiný typ derivace, nejčastěji na ileální konduit (ureteroileostomii). Důvodem může být recidiva nádoru v močové