

Raritní případ gigantických kondylomat (Buschke-Löwenstein) v urologické praxi

Case report of giant condyloma acuminatum
(Buschke-Löwenstein tumor)

Matůš Mlynářčík¹, Ivan Trávníček¹, Tomáš Pitra¹, Denisa Kacerovská², Milan Hora¹

¹Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň

²Šiklův ústav patologie, LF UK a FN Plzeň

Došlo: 9. 9. 2020

Přijato: 5. 11. 2020

Kontaktní adresa:

MUDr. Matůš Mlynářčík

Urologická klinika FN Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

e-mail: mlynarcikm@fnplzen.cz

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Zpracování této práce nebylo podpořeno žádnou společností.

SOUHRN

Mlynářčík M, Trávníček I, Pitra T, Kacerovská D, Hora M. Raritní případ gigantických kondylomat (Buschke-Löwenstein) v urologické praxi.

Prezentujeme kazuistiku gigantických získaných kondylomat (Buschke-Löwenstein tumor). Léze způsobená infekcí HPV (lidský papilomavirus) velikosti 25 cm byla řešena chirurgickou excízi ve spolupráci s plastickým chirurgem. Buschke-Löwenstein tumor je premaligní léze perigenitální oblasti způsobující lokální destrukci tkání s maligní transformací až v polovině případů.

KLÍČOVÁ SLOVA

Gigantické condylomata accuminata, Buschke-Löwenstein tumor, lidský papilomavirus.

SUMMARY

Mlynářčík M, Trávníček I, Pitra T, Kacerovská D, Hora M. Case report of giant condyloma acuminatum (Buschke-Löwenstein tumor).

We present a case report of giant condyloma acuminatum (Buschke-Löwenstein tumor). HPV (Human Papillomavirus) related lesion about the size of 25 cm was treated by wide radical excision. Buschke-Löwenstein tumors are classified as premalignant lesions of the perigenital area cause local destruction of tissues with the possibility of malignant transformation in half of the cases

KEY WORDS

Giant condyloma acuminatum, Buschke-Löwenstein tumor, human papilloma virus.

.....

ÚVOD

Gigantická condylomata accuminata neboli Buschke-Löwenstein tumor (BLT) jsou vzácnými lézemi perigenitální a perianální oblasti (1). Prvně byl BLT popsán Ludwigem Löwensteinem a Abrahamem Buschkem v roce 1925, podle kterých sdílí určité histopatologické znaky jak s dlaždicobuněčným karcinomem, tak s condylomata accuminata, ale současně se od nich