



**Obr. 3.** Uretrální ploténka tři měsíce po dermatologické léčbě

**Fig. 3.** Urethral plate three months after dermatological treatment



**Obr. 4.** Uretrální ploténka šest měsíců po dermatologické léčbě

**Fig. 4.** Urethral plate six months after dermatological treatment



**Obr. 5.** Aplikace bukálního štěpu dorzálně inlay dle ASOPY

**Fig. 5.** Dorsal inlay bucal mucosal grafting according to ASOPA



**Obr. 6.** Kompletní tubulizace uretry v rámci druhé doby urethroplastiky

**Fig. 6.** Complete urethral tubulization during second stage of urethroplasty



**Obr. 7.** Pohled po ukončené druhé době urethroplastiky

**Fig. 7.** Final view after second stage of urethroplasty



**Obr. 8.** Vzhled dva roky po operaci

**Fig. 8.** Final appearance two years after surgery

ním objemu 181 ml a postmikčním reziduem 0 ml. Uretrocystografie (UCG) prokázala panstrikturu uretry (obrázek 1). Jako první krok jsme zavedli epicystostomii. Následně jsme provedli první dobu

urethroplastiky – marsupializaci uretry s vyšíáním perineální uretrostomie (obrázek 2) a biopsii ložisek z postiženého glandu a uretry. Histopatologické vyšetření verifikovalo lichen sclerosus. Po zhojení