

Postpubertální teratom s malignitou somatického typu

Postpubertal teratoma with somatic-type malignancy

Petr Volf

Urologické oddělení Nemocnice Jihlava, p. o.

Došlo: 14. 1. 2022

Přijato: 22. 2. 2022

Kontaktní adresa:

MUDr. Petr Volf

Urgentní oddělení Nemocnice Jihlava, p. o.

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

e-mail: volf.petr@seznam.cz

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Zpracování článku nebylo podpořeno žádnou společností.

SOUHRN

Volf P. Postpubertální teratom s malignitou somatického typu.

Metastatické nádory varlat jsou relativně dobře léčitelné tumory reagující na chemoterapii na bázi platiny. Zejména v terapii seminomů po primární radikální orchiektomii převládá sledování reziduálních ložisek nebo podání chemoterapie před operačním řešením. Teratomy s malignitou somatického typu jsou ale tumory, které naopak operační léčbu vyžadují. Mohou se vyvinout u pacientů po předchozí terapii cisplatinou, a to jak u seminomů, tak non-seminomů. Většinou nereagují na chemoterapii a jedinou možností na vyléčení je kompletní resekce všech ložisek tumoru.

KLÍČOVÁ SLOVA

Nádory varlat, teratom s malignitou somatického typu, retroperitoneální lymfadenektomie.

ABSTRACT

Volf P. Postpubertal teratoma with somatic-type malignancy.

Metastatic testicular tumors are relatively well treatable tumors that respond to platinum-based chemotherapy. Especially in the therapy of seminomas after primary radical orchiectomy, monitoring of residual masses and chemotherapy predominate before the surgical approach. However, teratomas with somatic-type malignancy are tumors that require surgical treatment. They may develop in patients with seminomas and non-seminomas after previous cisplatin therapy. They usually do not respond to chemotherapy and the only cure is a complete resection of tumor masses.

KEY WORDS

Testicular tumors, teratoma with somatic-type malignancy, retroperitoneal lymphadenectomy.

.....

ÚVOD

Nádory varlat představují 1 % malignit u mužů dospělého věku a 5 % urologických malig-